Qu'est-ce qui peut tomber à l'examen ?

Référence :

voir l'item I – 7 – Q 76, traité dans notre numéro du 15 mars 2006

(Rev Prat 2006;56:563-71)

Seuls des éléments de réponse aux questions, fournis par l'auteur, vous sont communiqués. Cependant, selon les recommandations du CNCI, vos réponses devront être « rédigées » en faisant des phrases et des paragraphes.

Une maman de 28 ans vous amène son nourrisson de 1 mois en consultation. Il va être gardé en crèche.

■ QUESTION N° 1

Quelles vaccinations lui conseillez-vous ?

Éléments de réponse

■ RÉPONSE N° 1

• Les vaccinations recommandées chez le nourrisson à partir de l'âge de 2 mois sont celles contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hépatite B, et *Haemophilus influenzae*.
• En raison du mode de garde envisagé, la vaccination contre le pneumocoque par le vaccin conjugué est recommandée. Une vaccination associant les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est recommandée à l'âge de 9 mois. Enfin, la vaccination par le BCG reste obligatoire avant l'entrée en crèche et peut être réalisée dès l'âge de 1 mois.

■ RÉPONSE N° 2

• Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la vaccination par le BCG sont obligatoires.

■ QUESTION N° 2

Quelles sont celles obligatoires en crèche ?

Éléments de réponse

■ RÉPONSE N° 1

• Les vaccinations obligatoires en tant que professionnelle de santé sont la vaccination par le BCG, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, et la vaccination contre l'hépatite B.

■ RÉPONSE N° 2

Les vaccinations recommandées comportent :
➢ le rappel de la vaccination contre la coqueluche à effectuer lors d'un rappel diphtérie-tétanos-polio,
➢ la vaccination anti-grippale,
➢ la vaccination contre la varicelle en l'absence d'antécédent de varicelle et si la sérologie est négative,
➢ la vaccination contre la rougeole avec une dose du vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole en l'absence d'antécédent de vaccination contre la rougeole (après avoir vérifié l'absence de grossesse chez cette jeune fille).

Vous voyez en consultation une jeune fille de 20 ans qui va entrer en école d'infirmière.

■ QUESTION N° 1

Quelles sont les vaccinations obligatoires ?

Éléments de réponse

■ RÉPONSE

• Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués en cas d'immunosuppression. Les vaccins vivants disponibles en France sont les vaccins vivants vaux atténués (rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, fièvre jaune) et le BCG.
• Les autres vaccins sont réalisables, mais leur immunogénicité est diminuée en cas d'immunodépression.

■ QUESTION N° 2

Quelles vaccinations lui conseillez-vous ?

Éléments de réponse

■ RÉPONSE N° 1

• Les vaccinations obligatoires en tant que professionnelle de santé sont la vaccination par le BCG, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, et la vaccination contre l'hépatite B.

■ RÉPONSE N° 2

Les vaccinations recommandées comportent :
➢ le rappel de la vaccination contre la coqueluche à effectuer lors d'un rappel diphtérie-tétanos-polio,
➢ la vaccination anti-grippale,
➢ la vaccination contre la varicelle en l'absence d'antécédent de varicelle et si la sérologie est négative,
➢ la vaccination contre la rougeole avec une dose du vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole en l'absence d'antécédent de vaccination contre la rougeole (après avoir vérifié l'absence de grossesse chez cette jeune fille).

En cas d'immunodépression...

■ QUESTION

Quels sont les vaccins contre-indiqués ?

Éléments de réponse

■ RÉPONSE

• Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués en cas d'immunosuppression. Les vaccins vivants disponibles en France sont les vaccins vivants vaux atténués (rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, fièvre jaune) et le BCG.
• Les autres vaccins sont réalisables, mais leur immunogénicité est diminuée en cas d'immunodépression.

Auteurs :

Dr Diane van der Vliet, Dr Odile Launay

Service de médecine interne, CIC de vaccinologie Cochin-Pasteur, hôpital Cochin, 75679 Paris Cedex 14